

TAIWAN CDC

世界愛滋日

愛「之」間沒有差異

安全性行爲

單一固定性伴侶，過程正確使用保險套及水性潤滑液

不共用針頭、稀釋液

不與他人使用同一針頭與稀釋液，不使用毒品

懷孕時接受檢查

若媽媽為愛滋病毒感染者，懷孕期間好好服藥治療，寶寶接受預防性用藥即能有效降低感染機率。

感染愛滋病毒及早就醫，穩定服藥治療，值得擁有嶄新的正常人生！

愛滋自我篩檢

免費試劑電子兌換券推廣活動

只要有性行為者，建議都至少要進行1次愛滋篩檢唷！

如果篩檢出陽性/陰性，該怎麼辦？

愛滋病毒

陽性：可能感染愛滋病毒
建議至指定醫事機構進行確認檢驗

陰性：沒被感染或處於空窗期
*如持續有不安全性行為或合併出現發燒、疲倦、皮膚發疹或局部淋巴腺腫等症狀，建議定期篩檢

梅毒、淋病

陽性：代表感染
*應至醫療院所接受適當治療
*應請性伴侶一起診斷與治療，避免乒乓式感染

陰性：沒被感染或處於空窗期
*建議應避免風險行為
*定期檢驗

*孕婦患有愛滋病毒、梅毒或淋病，請依醫囑配合追蹤檢驗及治療，以避免傳染給寶寶。

衛生福利部疾病管制署 TAIWAN CDC 廣告

愛滋的傳染途徑

- 體液：**生殖泌尿道的分泌物，透過性行為的接觸。
- 血液：**例如毒癮患者共用針頭，或因各種原因接觸到愛滋病患者的血液。
- 母子的垂直感染：**就是媽媽得到愛滋以後把愛滋病傳染給小孩子。

B 幫幫傳播網 × f 輔仁基督敎醫院

淋病 梅毒與先天性梅毒

You should know

衛生福利部疾病管制署 補助編印

PEP 暴露愛滋病毒後 預防性投藥

如有不安全性行為、遭性侵害、共用針器或稀釋液等行為，而有直接接觸到疑似愛滋病毒的血液或體液，經評估後，在72小時內給予預防性投藥，以避免感染。

使用對象	發生疑似暴露愛滋風險行為者
服藥方式	暴露後72小時內儘速投藥 並持續28天每日服用
回診追蹤	抗原/抗體複合型檢驗：暴露後6週、3-4個月 抗體檢驗：暴露後6週、3-4個月、6個月

PrEP 暴露愛滋病毒前 預防性投藥

沒有感染愛滋病毒的人，經評估後，穩定持續服用藥物，讓體內有足夠的藥物濃度來預防可能被病毒感染的風險。

使用對象	持續有風險行為者且愛滋篩檢為陰性
服藥方式	1. 每日服用 (daily taken) 2. 依需求時使用 (on-demand) (女性不適用)

性行為前 2-24小時 服用2顆 prep
服藥後 24小時 服用1顆 prep
服藥後 48小時 服用1顆 prep



衛生福利部疾病管制署
TAIWAN CDC

做自己愛自己

- 安全性行為、
全程正確使用保險套
- 定期愛滋篩檢
- 暴露前預防性投藥 (PrEP)
- 避免多重性伴侶



牢記「性福3寶」

- 第1寶** 全程正確使用保險套
- 第2寶** 定期篩檢
- 第3寶** 預防性投藥 (PrEP)



衛生福利部疾病管制署
TAIWAN CDC

科普小教室

愛滋病為什麼不會藉由蚊子叮咬傳染？

- 愛滋病毒無法在蚊子體內增生，失去傳染力
- 蚊子叮咬後口器的殘血量極低，無法引起愛滋病毒感染

每種病毒要生長，都要有適合的環境及特性，像是登革熱、日本腦炎等，也只有特定蚊子(病媒蚊)可以傳播喔！

衛生福利部疾病管制署
TAIWAN CDC

安全性行為才叫做愛 (2020)

常見性傳染病如梅毒、淋病

安全性行為才叫做愛 (202008製)
製作日期：2020/8/31
授權條款：
原始檔： 國語



衛生福利部疾病管制署
TAIWAN CDC

男生女生都要看!

Check it out

安全性行為 愛得更長久

- 使用水性潤滑液
- 全程使用保險套
- 口交時也需要戴保險套，降低感染A型肝炎、桿菌性痢疾等傳染病的機會

